

DESPUES DE LA FINALIZACION DE TRATAMIENTO ENDODONTICO

El tratamiento endodontico a sido finalizado en su diente. Las raizes han sido selladas permanente. **FAVOR DE LLAMAR A SU DENTISTA GENERAL PARA UNA CITA. SU DENTISTA TIENE QUE PONER UNA RESTAURACION PERMANENTE EN SU DIENTE** para proteger su diente de fracturas o caries. En demorar este proceso usted esta poniendo su diente en riesgo.

El diente puede estar sensitive por varios dias por la manipulacion durante el tratamiento. Favor de evitar masticar en el diente hasta que la reatauracion permanente este finalizada. Cepillese los dientes como usualmente. Para la mayoria de pacientes, favor de tomar Advil, Ibuprofen o Motrin (3 tabletas de 200 mg. o 600 mg. cada 6 horas). Tylenol (2 tabletas de 500 mg. cada 6 horas) puede ser usado como una alternativo o en adicion a Advil, Ibuprofen, o Motrin por **tres** dias consecutivos si tiene o no tiene dolor. Medicacion adicional para el dolor puede ser recetada para el dolor mas severo. En el evento raro que el dolor sea severo o hinchazon comiensa, favor de llamar a la oficina inmediatamente.

Es importante que el diente que ha tenido tratamiento endodontico sea examinado cada ves que valla a su dentista general, un porcentaje pequeno de los dientes que han tenido tratamiento endodontico no se curan completamente. Radiografias de el diente los permiten que observar el proceso de curacion.

Su dentista va ser informado que su tratamiento endodontico ha sido finalizado y un reporte de progreso va ser mandado despues de cada visita.

Si tiene cualquier problema o pregunta, favor de llamar.

Reviewed: _____
 Initial Date